

DAG BRAAMPARELMOERVLINDER

Begin juli 2022 werd in het Molsbroek (Lokeren) een braampareldoervlinder (*Brenthis daphne*) waargenomen. Tot een paar decennia geleden vloog deze soort enkel rond in Zuid-Europa (de Pyreneeën en de Alpen tot in de Balkan), maar de laatste jaren is deze aan een flinke noordwaartse beweging bezig. Het exemplaar dat in het Molsbroek werd waargenomen, is de meest noordelijke waarneming in onze provincie, maar gezien de snelle opmars van de soort is het een kwestie van tijd tot er nog meer waarnemingen zullen volgen.

Thomas Van Lancker




Bovenkant braampareldoervlinder.

© Thomas Van Lancker

In 2006 werd deze dagvlinder voor het eerst in België waargenomen in de provincie Luxemburg (Gaume). Sindsdien bleef de soort zich verder noordwaarts uitbreiden en in 2011 was Nederland aan de beurt, meer bepaald Zuid-Limburg. Aanvankelijk werd gedacht dat de braampareldoer zeer honkvast was, maar het sterk veranderende klimaat heeft de soort toch wat extra duwtjes in de rug gegeven. Bovendien is de favoriete biotoop met bosranden, bloemrijke plaatsen met struiken en open plekken in het bos niet bepaald zeldzaam.

De braampareldoervlinder lijkt zeer sterk op de purperstreeppareldoervlinder (*Brenthis ino*). Een doorslaggevend onderscheid tussen beide soorten is te zien op de onderkant van de achtervleugel. Daar is de grote cel in het midden bij de braampareldoervlinder nl. gevuld met twee kleuren terwijl die bij de purperstreeppareldoervlinder maar één kleur heeft. De purperstreeppareldoervlinder is echter heel wat zeldzamer en komt van nature voor in vochtige habitats en beekvalleien met als waardplant de moerasspirea.

De braampareldoervlinder legt haar eitjes op – hoe kan het ook anders – gewone braam, maar ook framboos is een waardplant. In onze regio – waar nitrofiële of stikstofminnende planten als bramen welig tieren – lijken alvast voldoende leefgebieden voorhanden. De kans is dus relatief groot dat deze soort jaarlijks zal opduiken in en rond onze natuurgebieden en zelfs onze tuinen.



In tegenstelling tot bij de purperstreeppareldoervlinder is bij de braampareldoervlinder de grote cel in het midden op de onderkant van de achtervleugel gevuld met twee kleuren (zie inzet). © Vilda