

LIJST VAN LEPIDOPTERA UIT DE ANTWERPSE OMGEVING

ADDENDUM 7

Familie : Satyridae

Coenonympha arcania L.

Op de wekelijkse bijeenkomst van de leden van de Antwerpse Vereniging voor Entomologie toonde A. van de Poel (Ekeren) een ♂ van *C. arcania* L., dat door hem te Ekeren gevangen werd op 13 juni 1968. De vlinder komt hoofdzakelijk voor in het Maasbekken en is plaatselijk talrijk, vooral in de Kalkstreek. Gegevens over voorkomen in het noorden van het land zijn heel schaars: volgens Cat. Lambillion (1903) zou *C. arcania* ooit in het Zoniënwood aangetroffen zijn. Verder bestaat er een oude opgave voor Limburg. In Nederland vliegt de soort regelmatig op de Veluwe. Verder zijn er oudere vangsten van zwervers bekend in het zuiden en oosten van het land. Voor Noord-Brabant geeft Cat. Lempke twee vindplaatsen : Breda (1866) en Oisterwijk (1952).

Wat nu het exemplaar van Ekeren betreft : het dier werd gevangen samen met een exemplaar van *C. pamphilus* L. De vinder, die toen nog maar pas begonnen was met het aanleggen van een vlinderverzameling, had toen zijn vangst genomen voor een gewoon hooibeestje. Een tijdje later, toen het hem duidelijk werd dat het een andere soort betrof, is hij meermalen op het terrein teruggekeerd in de hoop nog andere exemplaren te bemachtigen.

Het gaat hier zeker om een zwerver of wellicht een adventief.

A. Janssen

INTERESSANTE ARTIKELS

Alexanor, Tome VIII, fascicule 5, 1974

R. Essayan nam in augustus van 1970 en 1972 een honderdtal dagvlindersoorten waar in de omgeving van het meer van Vourget (Frankrijk, Departement Isère). In het artikel geeft hij per vindplaats een kort verslag.