

met de karakteristieke gebogen lijnen aan de basis der voorste vleugels, werd slechts enkele malen in ons land gevangen. Volgens Albert Legrain in voormeld artikel werden er tussen 1908 en 1973 een twaalftal exemplaren gevangen, waarvan een achttal in de kalkstreek van de Maas. 1 ♂ te Aye-lez-Marche (Richard), 2 ♂ te Belvaux-sur-Lesse, 1 ♂ te Briquemont-Mont Gauthier (Verstraeten), 1 ♂ te Tellin (Legrain), 1 ♀ Bois de Petit-Han (Evrard), te Barvaux (Bolland en Spronck). In de Limburgse Kempen 2 ♂ te Zutendael (De Laever).

Op 14 augustus heb ik deze soort gevangen te Daverdisse. Kurt Lampert vermeldt de vliegtijd in juni en juli in Midden-Europa als zeldzaam.

De rups leeft op eik tot midden september en de pop overwintert.

Hyboma strigosa Den. & Schiff.

1 ♂ gevangen op 15 juli 1974 te Neupont op hooggelegen weide. Lokaal verspreid en zeer zeldzaam.

In cat. Lambillion te Luik, Visé, Brussel, Walcourt en Warnant, Oneux en Theux.

Cat. Derenne : te Tienen (Schammel),

Lambillionea 45 : Petit-Han, Xhoris en Touraing-la-Chaunée.
- 55 : Han-sur-Lesse in 1954.

De rups leeft op Prunus spinosa L., Crataegus monogyna Jacq., Betula, Carpinus en Sorbus, vanaf september en verpopt voor de winter.

In sommige streken is er een tweede generatie, waarvan de rups leeft in juli, maar zelden tot imago ontwikkelt. De vliegtijd begint in juni en eindigt begin augustus.

In een volgend artikel zal ik een overzicht geven van het aantal Heterocera-soorten, gevangen in 1973 en 1974 in de noordwestelijke hoek van de provincie Luxemburg.

Rob Van averbeke

KODE VOOR HET VERZAMELEN VAN INSEKTEN

(Vervolg)

3. Verzamelen met licht

- De vangst in een val moet niet onmiddellijk gedood worden voor later onderzoek.
- Er mogen alleen vallen zonder verdovende middelen worden gebruikt.

- Na het determineren moeten de insekten opnieuw vrijgelaten worden op enige afstand van de val, in hoog gras of tussen struiken.
- Insekten die men niet nodig heeft voor wetenschappelijk werk, mogen niet gebruikt worden als vis- of vogelvoeder.
- Als je ontdekt dat een lichtval voor wetenschappelijk onderzoek onnodig zeldzame of lokale soorten vangt, moet ze verwijderd worden.

4. Vergunning en voorwaarden

- Voor het verzamelen in natuurreservaten moet een lijst van de verzamelde soorten voorgelegd worden aan de conservator.
- Voorts moet men, vooral in de natuurreservaten, rekening houden met punt 5.

5. Schade aan de omgeving

- Beschadig zo weinig mogelijk de omgeving. Denk aan andere natuurliefhebbers. Pas vooral op voor vogelnesten en zeldzame vegetatie.
- Als je rupsen of andere insekten uit de bomen of struiken slaat, moet je dat zo doen dat je niets beschadigt.
- Coleopterologen en andere onderzoekers van dood plantenmateriaal moeten dit zo goed als mogelijk in de oorspronkelijke staat terugbrengen.
- Omgedraaide stenen moeten in dezelfde stand teruggelegd worden.
- Voedsel voor het kweken van insekten moet met een mes worden afgesneden en niet worden afgebroken.

6. Kweken

- Kweken is een veel betere methode dan het vangen van een grote reeks insekten in de natuur.
- Vang nooit meer rupsen e.d. dan je kunt kweken, gelet op de voedselvoorziening.
- Ongewenste insekten die met het voedsel aangevoerd werden, moeten in het oorspronkelijke biotoop weer vrijgelaten worden en niet zo maar ergens.

Het komitee geeft daarbij een lijst van 81 vlindersoorten die zeldzaam zijn of zeer lokaal voorkomen in Groot-Brittannië. Deze soorten, waaronder Maculinea arion L., Papilio machaon L., Erebia aethiops Esp., Nymphalis polychloros L., Endromis versicolora L., Malacosoma castrensis L., moeten met grote omzichtigheid behandeld worden.

W. De Prins
