

Ennomos alniaria L. : Op 14-8-70 en 27-9-71 telkens 1 ex.  
te Oud-Turnhout.

Ennomos erosaria Schiff. : Turnhout : 25-8-73, 1 ex.

Gonodontis bidentata Cl. : Vosselaar : 2 ex. op 3-6-73.

Lycia hirtaria Cl. : 2 ex. te Oud-Turnhout op 8-5-75.

Boarmia extersaria Hbn. : Turnhout : 1 ex. op 6-6-70.

Boarmia punctulata Schiff. : Turnhout : 1 ex. op 1-5-71 en  
18-6-72.

Ellopia fasciaria L. : Turnhout : 1 ex. 6-6-71.

#### Geometrinae

Chlorissa viridata L. : Turnhout : 1 ex. op 7-6-73.

Mol : 1 ex. op 23-6-75.

Alex Riemis

---




### ARCHIPS    DECRETANA    TREITSCHKE

(Tortricidae)

Op 23 juni 1974 ving ik een klein vlindertje te Brasschaat dat ik aanvankelijk als Archips podana Scop. determineerde. Toen ik het opgezette exemplaar echter vergeleek met de dieren in de verzameling van de vereniging, stelde ik vast dat het een andere soort betrof. Met het werk van Bentinck en Diakonoff (1968) kon ik de vlinder vrij vlug determineren als A. decretana Tr. Deze soort lijkt uiterlijk sterk op A. podana, maar de achtervleugels zijn bij decretana duidelijk tweekleurig, terwijl ze bij podana eenkleurig bruingeel zijn. Bij decretana is de bovenste helft van de achtervleugels wit, de onderste helft grijsgeel. A. podana bezit een donker streepje voor de achterrand van de voorvleugels dat bij decretana ontbreekt.

De mannelijke genitaalapparaten bevestigden de determinatie op overtuigende wijze : de sacculus eindigt bij decretana in een spits die voorbij de valverand uitsteekt. Bij podana eindigt de sacculus op een stompe punt die niet voorbij de valverand uitsteekt. De spitsen en de aanhangsels van de aedoeagi zijn bij beide soorten duidelijk verschillend.

A. decretana wordt door Ihomme niet uit België vermeld. Voor Frankrijk schrijft hij enkel : Orientale - VII - Alsace (de Peyerimhoff). De Laever ving het eerste Belgische



Archips podana Scop. (links)

Archips decretana Tr. (rechts)

Van boven naar onder : imago, mannelijk genitaalapparaat  
en aedeagus.

exemplaar te Neerpelt op 15-7-1956 (zie Janmouille, 1959). Ik heb geen andere vermelding kunnen vinden. De vangst te Brasschaat zou dus het tweede Belgische exemplaar kunnen zijn.

Het areaal van de soort spreidt zich over Midden-Europa uit tot Siberië. Volgens Meyrick ligt de meest westelijke vindplaats in Norfolk. In Nederland komt de soort bijna uitsluitend in het oosten en zuidoosten voor. Bentinck geeft slechts twee vindplaatsen in Noord-Brabant : Bergen-op-Zoom en Valkenswaard.

A. decretana komt voor op vochtige terreinen. De rups leeft in mei en juni tussen samengesponnen bladeren van verscheidene struiken en bomen. Alle geraadpleegde auteurs vermelden echter gagel (Myrica gale L.) die op de vindplaats overvloedig voorkomt. De vliegtijd valt tussen juni en augustus.

W.O. De Prins

Literatuur :

- Bentinck, G.A. & Diakonoff - "De Nederlandse Bladrollers (Tortricidae)", 1968.
- Janmouille, E. - "Espèces nouvelles pour la faune belge : 1. Cacoecia decretana Tr.", Lambillionia 1959, p. 21.
- Ihomme, L. - "Catalogue des Lépidoptères de France et de Belgique, II, Microlépidoptères". (1935-46).
- Meyrick, E. - "A revised Handbook of British Lepidoptera" 1927 (Reprint 1970).

---

LIJST VAN LEPIDOPTERA UIT DE ANTWERPSE OMGEVING

ADDENDUM 10

Familie : Sphingidae

**Celerio gallii Schiff.**

Te Mechelen werd door D. Van den Abbeele in augustus 1973 een rups gevonden die op 19-6-1974 de vlinder leverde (zie verder de beschrijving van de kweek door de vinder). Deze soort wordt in ons land voornamelijk in het oosten aangetroffen (Limburg, Luik, Namen, Luxemburg). Waarnemingen in het noorden waren tot nu toe bijna niet gemeld (Fontaine vond de vlinder in Beverlo).