

exemplaar te Neerpelt op 15-7-1956 (zie Janmouille, 1959). Ik heb geen andere vermelding kunnen vinden. De vangst te Brasschaat zou dus het tweede Belgische exemplaar kunnen zijn.

Het areaal van de soort spreidt zich over Midden-Europa uit tot Siberië. Volgens Meyrick ligt de meest westelijke vindplaats in Norfolk. In Nederland komt de soort bijna uitsluitend in het oosten en zuidoosten voor. Bentinck geeft slechts twee vindplaatsen in Noord-Brabant : Bergen-op-Zoom en Valkenswaard.

A. decretana komt voor op vochtige terreinen. De rups leeft in mei en juni tussen samengesponnen bladeren van verscheidene struiken en bomen. Alle geraadpleegde auteurs vermelden echter gageel (Myrica gale L.) die op de vindplaats overvloedig voorkomt. De vliegtijd valt tussen juni en augustus.

W.O. De Prins

Literatuur :

- Bentinck, G.A. & Diakonoff - "De Nederlandse Bladrollers (Tortricidae)", 1968.
- Janmouille, E. - "Espèces nouvelles pour la faune belge : 1. Cacoecia decretana Tr.", Lambillionia 1959, p. 21.
- Ihomme, L. - "Catalogue des Lépidoptères de France et de Belgique, II, Microlépidoptères". (1935-46).
- Meyrick, E. - "A revised Handbook of British Lepidoptera" 1927 (Reprint 1970).

LIJST VAN LEPIDOPTERA UIT DE ANTWERPSE OMGEVING

ADDENDUM 10

Familie : Sphingidae

Celerio galli Schiff.

Te Mechelen werd door D. Van den Abbeele in augustus 1973 een rups gevonden die op 19-6-1974 de vlinder leverde (zie verder de beschrijving van de kweek door de vinder). Deze soort wordt in ons land voornamelijk in het oosten aangetroffen (Limburg, Luik, Namen, Luxemburg). Waarnemingen in het noorden waren tot nu toe bijna niet gemeld (Fontaine vond de vlinder in Beverlo).

In zijn addenda op de "Catalogue des Lépidoptères" van Lambillion schrijft Derenne dat Celerio galii vroeger voorkwam in de duinen (niet controleerbaar). De vlinder moet in de voorbije eeuw veel meer verspreid zijn geweest in West-Europa, dank zij o.a. de teelt van Meekrap (Rubia tinctorum).

In Nederland komt het dier onregelmatig voor en sommige jaren worden de rupsen vrij talrijk gevonden op zandgrond. Wat Noord-Brabant betreft, geeft de Katalogus Lempke (en supplement) een achttal vindplaatsen (o.a. Mierlo waar in 1956 meer dan 200 rupsen werden verzameld!). Als voedselplanten van de rups worden buiten Galium verum en Epilobium ook Oenothera (Cat. Lempke) en de bovengenoemde Rubia tinctorum aangegeven.

Familie : Sphingidae

Hippotion celerio L.

Ons trouw medelid van de Vereniging voor Entomologie Theo Garrevoet was wel aangenaam verrast toen hij op 1 oktober 1975 een prachtexemplaar van de grote wingerdijlstaart vond vlak bij zijn woning te Kruibeke.

Deze tropische immigrant wordt in ons land zeer zelden waargenomen. Cat. Lambillion-Derenne vermeldt enkele vangsten uit het midden van het land en verder één van Luik, Namen en Dinant.

Lempke noemt Hippotion celerio "een van onze zeldzaamste immigranten". In Noord-Brabant werd de vlinder op twee plaatsen gevonden (Cat. Lempke).

A. Janssen

CELERIO GALII SCHIFF. TE MECHELEN

(Sphingidae)

Wegens de belangstelling voor mijn vondst van de walstropijlstaart; meen ik dat het de moeite waard is er een artikelje aan te wijden.

Op 23-8-1973 zocht ik in de namiddag met een vriend rupsen van het avondrood (Deilephila elpenor L.) op een braakliggend terrein op Stuivenberg in de buurt van het Vrijbroekpark te Mechelen. Het viel op dat we geen rupsen aantroffen op het harige wilgeroosje (Epilobium hirsutum L.) maar wel op de gewone soort (Epilobium angustifolium L.) en te