

## LIJST VAN LEPIDOPTERA UIT DE ANTWERPSE OMGEVING

### ADDENDUM 11

Familie : Noctuidae

Subfamilie : Hadeninae

**Mythimna l-album L.**

Mechelen : 9-9-1970, 1 ♂ (D. van den Abbeele)

Deze vlinder, die in Midden- en Zuid-Europa vooral vochtige weilanden bewoont, is in ons land aangetroffen te Leuven, Namen, Dinant, Jambes, Ortho en Ganshoren (Cat. Lambillion-Derenne). Cat. Lhomme vermeldt : Belgique : "Assez répandu, mais pas très commun". Tot nog toe is de soort maar weinig gevangen in het noorden van België.

In Nederland waren tot in het begin van deze eeuw maar vijf exemplaren gevonden. De volgende vangst dateerde van 1922 (Limburg). Maar vanaf 1934 werd de vlinder regelmatig aangetroffen in verscheidene provincien. In 1946 werd de vlinder opnieuw gemeld uit Noord-Brabant waar hij reeds op zes vindplaatsen werd gevangen. Daarvoor waren slechts 2 exemplaren gemeld uit Breda, gevangen vóór 1900.

De soort verschijnt geregeld in de trekvlinderverslagen en wordt sommige jaren talrijk gevonden. Volgens Lempke is Mythimna l-album van zeldzame immigrant tot een bestanddeel van de Nederlandse fauna geworden, zeker wat Zuid- en Midden-Limburg betreft. Deze areaaluitbreiding zou waarschijnlijk een gevolg zijn van een klimaatswijziging.

Voor verdere gegevens over deze interessante kwestie leze men de uitgebreide nota van de heer Lempke in het tiende supplement van zijn onvolprezen catalogus (p. 119-120).

Warnecke bespreekt ook de areaaluitbreiding van Mythimna l-album in zijn "Rezente Arealvergrösserungen bei Macrolepidoptera in Mittel- und Nordeuropa". In Noord-Duitsland, waar de vlinder nu ook aangetroffen wordt, blijft hij op vele plaatsen een zeldzaamheid.

In Denemarken werd de soort sinds 1950 gevangen maar ze behoort er tot de zeldzaamheden.

Subfamilie : Ophiderinae

**Lygephila craccae Schiff.**

Turnhout : 10-6-1971, 1 ex. (B. Maes)

Buiten een paar vindplaatsen in de Kalkstreek (Logne-sur-Ourthe, Furfooz) geeft de Cat. Lambillion-Derenne één vind-

plaats in het noorden van het land : Hal. Het betreft hier een warmteminnende soort die in Europa haar hoofdverspreiding heeft op droge plaatsen in Midden- en Zuid-Europa, vooral op kalk. Hoewel Cat. Lhomme voor Frankrijk aangeeft : "partout", kan zeker niet het noorden van het land bedoeld zijn! De vlinder wordt niet vermeld in de Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera van Lempke.

In Denemarken werd het eerste exemplaar in 1951 gevangen. De soort is er echter zeer zeldzaam. In Noordwest-Duitsland is de vlinder afwezig. In het oosten van Oostenrijk en in Hongarije is Lygephila cracca niet zeldzaam. De rups leeft op Vicia-soorten.

Een zeer merkwaardige vangst!

---

Familie : Geometridae

Subfamilie : Sterrhinae

**Sterra vulpinaria H.-S.**

Arendonk : 9-8-1975, 1 ♂ op licht (J. Schuurmans)

De vlinder is in ons land gevonden op verscheidene plaatsen in de provincie Namen, verder te Virton en Brussel. In Nederland is hij van vele plaatsen gemeld. Cat. Lempke geeft voor Noord-Brabant vijftien vindplaatsen! Dat de vlinder tot nu toe niet waargenomen was in het Antwerpse zal wel te wijten zijn aan het ontbreken van systematische nachtvangsten. De rups is polyfaag.

A. Janssen

---

#### INTERESSANTE VLINDERWAARNEMINGEN

1. Een zeldzame Psychidae : Oreopsyche plumifera O.  
(atra auct. nec L.)

Te Lommel (Limburg) werd in mei 1975 1 ♂ van deze zeer weinig uit ons land gesignaleerde soort gevangen. En hier was nogmaals B. Maes (Zwijndrecht) de vinder! De vlinder was tot nu toe aangetroffen te Dinant en Zutendaal (Cat. Lambillion-Derenne). In Nederland is het dier een typische bewoner van heiden.

2. Waarnemingen in het Antwerpse door leden van de Vereniging voor Entomologie.

Drepana curvatula Bkh., Zoersel, 10-7-1975, op licht (J. Schuurmans).