

Korte mededeling

Danaus chrysippus (LINNAEUS, 1758) en andere trekvlinders op Kérkira (Korfoe) (Lepidoptera : Nymphalidae Danainae)

De eerste twee weken van oktober 1992 verbleef ik op Kérkira (Korfoe), Griekenland. Ondanks het feit dat het seizoen reeds laat gevorderd was en dus dagvlinders niet zo hoog op mijn verlanglijstje stonden, kon ik toch enkele interessante waarnemingen doen.

Zo kwam *Vanessa cardui* (LINNAEUS, 1758) overal zo massaal voor, dat men op braakliggend terrein waar nog bloemen voorkwamen, geen stap kon zetten zonder een twintigtal vlinders op te schrikken. Er moeten toen miljoenen *cardui*'s voorgekomen zijn op Kérkira.

Het meest opmerkelijke was echter het voorkomen van *Danaus chrysippus* (LINNAEUS, 1758). In totaal nam ik 4 exemplaren waar. Eén mannetje kon ik vangen op 14 oktober te Ilomos, waarbij ik nog een tweede exemplaar waarnam, beide fourageerden tussen duizenden *cardui*'s. De beide andere exemplaren zag ik op 16 oktober, 10 km ervandaan te Moraitika : ik lag zo'n 2 uren op de loer bij een vijgeboom met rijpe vruchten om een *Charaxes jasius* (LINNAEUS, 1767) van de tweede generatie te vangen. Eenieder met ervaring met deze vlinder zal begrijpen dat ik meer vlinders heb gezien dan gevangen (uiteindelijk had ik er toch een in het net). Op zo'n 4 meter hoogte zag ik twee *Danaus chrysippus* met een tussenpauze van 1 uur, in een voor de trek typische glijvlucht.

Ik was ook blij met de vangst van een wijfje van *Colias crocea* (FOURCROY, 1785), forma *helicina*. Deze vrij zeldzame vorm heeft een gele kleur die in de vlucht doet denken aan *Colias hyale* (LINNAEUS, 1758). Verder trof ik zo laat in het seizoen toch nog twee afgevlogen mannetjes van *Argynnis paphia* (LINNAEUS, 1758) aan en te Pelekas ook *Papilio machaon* (LINNAEUS, 1758) (hill-topping).

Dat op Kérkira goede omstandigheden voor vlindertrek geheerst hebben, doet zich ook vermoeden uit de nachtvangsten op menglicht. Hoewel het aantal vangsten eerder tegenviel, betrof één op twee een vlinder die hier als trekvlinder is gekatalogeerd. Een aantal hiervan wordt verondersteld net als *Danaus chrysippus* in Afrika zijn herkomst te vinden. Zo noteerde ik tussen 3 en 16 oktober : *Nomophila noctuella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Palpita unionalis* (HÜBNER, 1796), *Rhodometra sacraria* (LINNAEUS, 1767), *Agrius convolvuli* (LINNAEUS, 1758), *Agrotis ipsilon* (HUFNAGEL, 1766), *Peridroma saucia* (HÜBNER, [1808]), *Mythimna loreyi* (DUPONCHEL, 1827), *Mythimna l-album* (LINNAEUS, 1767), *Hoplodrina ambigua* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Spodoptera exigua* (HÜBNER, [1808]), *Heliothis peltigera* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Heliothis nubigera* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851), *Heliothis armigera* (HÜBNER, [1808]), *Syngrapha interrogationis* (LINNAEUS, 1758), *Trichoplusia ni* (HÜBNER, [1803]), *Chrysodeixis chalcites* (ESPER, 1789), *Autographa gamma* (LINNAEUS, 1758).

(Bart VANHOLDER, Droeskouter 33, B-9450 Haaltert)