

Ajouts à la distribution géographique du genre *Crocota* (Lepidoptera: Geometridae)

R. H. Nyst

Samenvatting. Gegevens over de geografische verspreiding van het genus *Crocota* (Lepidoptera: Geometridae)

Enkele gegevens over de geografische verspreiding van het genus *Crocota* worden medegedeeld. *Crocota pseudotinctaria* Leraut, 1998 blijkt ook in Oostenrijk voor te komen. *Crocota pseudotinctaria* en *C. tinctaria* (Hübner, [1799]) komen sympatrisch voor.

Abstract. Additional data on the geographical distribution of the genus *Crocota* (Lepidoptera: Geometridae)

Some data on the geographical distribution of two *Crocota* species are mentioned. The range of *Crocota pseudotinctaria* Leraut, 1998 extends until Austria. *C. pseudotinctaria* and *C. tinctaria* (Hübner, [1799]) occur sympatrically.

Key words: *Crocota* – *tinctaria* – *pseudotinctaria* – faunistics – distribution – Austria.

Nyst, R. H.: Bd. de Dixmude 17, B-1000 Bruxelles.

L'étude du genre *Crocota* Hübner, publiée par Leraut (1999) m'a rappelé ces géométrides d'un orange plus ou moins vif dormant dans mes boîtes et dont j'ignorais jusqu'alors l'intérêt caché. L'expérience nous apprend que toutes les données peuvent avoir une valeur. C'est pourquoi je me permets ce modeste ajout à l'étude précitée; d'autant que mes exemplaires sont relativement récents. Je noterai que sur les 17 exemplaires, de cinq localités différentes, que je possède, ne se comptent que deux femelles. Curieux, ce déséquilibre (parfois explicable, parfois non) très caractéristique de certaines espèces. Je note, ci-dessous, les espèces et sous-espèces dans l'ordre où les présente Leraut (*l.c.*).

Crocota tinctaria tinctaria (Hübner, [1799])

France, Alpes-de-Haute-Provence, Saint-André-les-Alpes, 900 m, 16.VII.19825, 2♂, leg. Pierre Nyst.

Crocota tinctaria estachyi Leraut, 1999

France, Alpes-Maritimes, La Bollène et Belvédère, 1500 et 1600 m, 17.VII.1989 et 23.VII.1993, 2♂, leg. Dr. Willy Hansen.

Crocota tinctaria vintejouxii Leraut, 1999

France, Puy-de-Dôme, Col-de-la-Croix-Morand, 1400 m, 25.VII.1979, 7♂ et 1♀, leg. R. H. Nyst.

Crocota pseudotinctaria Leraut, 1999

Suisse, Saas-Fee, 2500 m, 17.VII.1969, 2♂ et 1♀, leg. Daniel Luyten.

Autriche, Tyrol, Sölden, 2500 m, 21.VII.1970, 2♂, leg. Daniel Luyten.

Je voudrais souligner ces deux dernières prises puisqu'elles ont été faites en Autriche, pays qui ne figure pas parmi les références géographiques reprises dans l'étude de Leraut (*l.c.*). Il apparaît donc que dans la distribution donnée en fig. 67, la zone 6 peut chevaucher la zone 7, vers l'est jusqu'en son milieu. Il en faut déduire que les deux espèces cohabitent, ce que la disposition des zones, 4, 6 et 7 rend d'ailleurs logique.

Référence

Leraut, P. 1999. Contribution à l'étude des espèces du genre *Crocota* Hübner (Lepidoptera: Geometridae). — *Alexanor* 20(8)(1998): 467–481.

Phegea 28 (3) (1.IX.2000): 123