

## ***Bolitophagus reticulatus* aan de westrand van Brussel (Coleoptera: Tenebrionidae)**

Willy Troukens

**Abstract.** *Bolitophagus reticulatus* at the westside of Brussels (Coleoptera: Tenebrionidae)  
On 03 August 2004, a male of *B. reticulatus* (Linnaeus, 1767) was caught at Dilbeek (Brabant)  
in a light trap. It is the second record of this species in Belgium.

**Résumé.** *Bolitophagus reticulatus* à la périphérie ouest de Bruxelles (Coleoptera:  
Tenebrionidae)

Le 03 août 2004, un mâle de *B. reticulatus* (Linnaeus, 1767) a été capturé à Dilbeek (Brabant)  
dans un piège lumineux. C'est le deuxième exemplaire trouvé en Belgique.

**Key words:** *Bolitophagus reticulatus* – Belgium – faunistics.

Troukens, W.: Ninoofsesteenweg 782/8, B-1070 Anderlecht.


Op 3 augustus 2004 vond ik in mijn kleine Heath-val te Dilbeek (Brabant) een mannetje van *Bolitophagus reticulatus* (Linnaeus, 1767). Ik had dit kevertje hier nog nooit eerder gezien.



Figuur 1: *Bolitophagus reticulatus*, België, Brabant, Dilbeek, 03.VIII.2004, leg. W. Troukens.

*B. reticulatus* is een dofzwarte rouwtor van 7 mm lengte. Het halsschild is diep en dicht bestippeld en valt op door de vooruitstekende voorhoeken en de doornachtige achterhoeken; de zijrand is breed afgeplat en zwak gekarteld. De evenwijdige dekschilden zijn gekenmerkt door de scherpe schouderhoeken, de 9 grove stippelrijen en de fijne, kielvormige tussenribben die soms onderbroken zijn. De eerste 2 ribben naast de naad zijn fijner dan de overige. De voorschenen dragen 2 kleine eindsporen; bij de mannetjes zijn ook de midden- en

achterschenen voorzien van een klein eindspoor. De mannetjes zijn tevens te herkennen aan de lange, witte haren op het 3de tot het 7de sprietlid.



Figuur 2: Vindplaatsen in België van *Bolitophagus reticulatus* (Linnaeus, 1767): Ville-Pommeroeul en Dilbeek.

Volgens Keer (1930: 839) leeft *B. reticulatus* in boomzwammen (*Polyporus*) van beuken, lijsterbessen en sparren. Er zijn ook waarnemingen gemeld op dode vogels. De kever komt voor in heel Europa —in Midden-Europa vooral in bergstreken (Kaszab 1969: 247)— en verder tot in Centraal-Rusland. In Nederland is dit insect nog niet gevonden (Brakman 1966: 145). In België was tot nu toe slechts één vangst bekend: Ville-Pommeroeul, 27.VII.1970 (Libbrecht 1988: 17). De vondst te Dilbeek bewijst dat *B. reticulatus* in België wel degelijk inheems is. Het is een rouwtor die, mits gericht zoeken, wellicht ook zou kunnen gevonden worden in de oude Brabantse beukenbossen zoals het Zoniënwood.

### Bibliografie

- Brakman, P. J., 1966. Lijst van Coleoptera uit Nederland en het omliggend gebied. — *Monografieën van de Nederlandse Entomologische Vereniging* 2.
- Libbrecht, M. B., 1988. Catalogue des Tenebrionidae (Coleoptera) de Belgique. — *Studiedocumenten van het K.B.I.N.* 51.
- Kaszab, Z., 1969. Tenebrionidae. In: Freude, Harde & Löhse, *Die Käfer Mitteleuropas. Band 8.* — Goecke & Evers Verlag, Krefeld.
- Keer, P. M., 1930. *Calwer Keverboek, Band 2.* — Thieme & Cie., Zutphen.