

Korte mededeling: Het beukenrouwtorretje, *Diaclina fagi*, ook aangetroffen in Frankrijk (Coleoptera: Tenebrionidae)

Willy Troukens

Diaclina fagi (Panzer, 1799) werd in België voor het eerst gevonden in 2008 (Troukens 2010: 21–22). Oorspronkelijk leefde dit kevertje in Zuid-, Midden- en Oost-Europa maar het verspreidde zich vanaf 1944 ook in Duitsland (Reibnitz 2006: 1).

Uit een publicatie van F. Soldati (2007: 10) blijkt dat *D. fagi* nu ook Frankrijk is gaan koloniseren. Sinds 1980 is zijn aanwezigheid al gemeld in 17 departementen. Het verspreidingskaartje situeert zijn aanwezigheid in 14 zuidelijke departementen waaronder Corsica, maar ook noordelijker in de departementen Haute-Savoie, Moselle en Bas-Rhin.

In West-Europa is de opmars van *D. fagi* blijkbaar niet meer te stuiten. Eigenaardig genoeg is hij in buurland Nederland nog altijd niet gemeld (Vorst 2010: 139–141).

Graag een woord van dank aan Jean-David Chapelin-Viscardi (Muséum des Sciences naturelles, France, Orléans) voor zijn bereidwillige hulp bij het zoekwerk naar Franse informatiebronnen.

Bibliografie

- Reibnitz, J. 2006. *Die Käfer-Fauna Südwestdeutschlands. Tenebrionidae, Schwarzkäfer, Diaclina fagi* (Panzer, 1799). — Arge SWD Koleopterologen, www.entomologie.stuttgart.de [01 september 2009].
- Soldati, F. 2007. Fauna of France and Corsica. Coleoptera Tenebrionidae (Alleculinae excluded). Systematic catalogue and atlas. — *Mémoires de la Société linnéenne de Bordeaux* **6**: 1–185.
- Troukens, W. 2010. Een nieuwe keversoort voor de Belgische fauna: het beukenrouwtorretje, *Diaclina fagi* (Coleoptera: Tenebrionidae). — *Phegea* **37**(1): 21–22.
- Vorst, O. 2010. Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera). — *Monografieën van de Nederlandse Entomologische Vereniging* **11**.
-