



PHEGEA

driemaandelijks tijdschrift van de
VLAAMSE VERENIGING VOOR ENTOMOLOGIE

Redactieadres: 2170 Merksem 1

ISSN 0771-5277

Periode: april – mei – juni 2011

Erkeningsnr. P209674

Redactie: Dr. J.–P. Borie (Compiègne, France), Dr. L. De Bruyn (Antwerpen), T. C. Garvoet (Antwerpen), B. Goater (Chandlers Ford, England), Dr. K. Maes (Tervuren), Dr. K. Martens (Brussel), H. van Oorschot (Amsterdam), W. O. De Prins (Leefdaal).

Redactie-adres: W. O. De Prins, Dorpstraat 401B, B-3061 Leefdaal (Belgium).

e-mail: willy.deprins@gmail.com.

Uitgegeven met de steun van de provincie Antwerpen.

Jaargang 39, nummer 2

1 juni 2011

Een immigrant uit Australië: *Phoracantha semipunctata* (Coleoptera: Cerambycidae)

Willy Troukens

Door de toenemende handelsactiviteiten met Australië en Nieuw-Zeeland worden in Europa steeds meer keversoorten opgemerkt die afkomstig zijn uit deze regio's. Voor sommige soorten blijft het bij een eenmalige waarneming zoals van *Diaphonia dorsalis* Donovan, 1802 (Scarabaeidae) te Ternat (Brabant) op 20 januari 1980 (Troukens 1985: 92). Andere zijn hier ingevoerd met ladingen fruit of hout en zijn erin geslaagd om zich op Europese bodem voort te planten. *Paratillus carus* (Newman, 1840) (Cleridae) is hiervan een schoolvoorbeeld. Dit mierkevertje vestigde zich vanaf 1933 in Engeland en vanaf 1983 in Zuid-Frankrijk vanwaar het pogingen doet om ook Midden-Europa te koloniseren (Chapelin-Viscardi 2009: 354–372).

Mijn buurvrouw, Daniëlle Bouffieux, die geregeld in Portugal verblijft en mijn interesse voor kevers kent, brengt soms ook wel eens een insect mee. Op 24 mei 2005 ving ze in het plaatsje Olhos d'Agua een ongewone boktor van 20 mm lengte. Na heel wat speurwerk bleek het te gaan om *Phoracantha semipunctata* (Fabricius, 1775) (Cerambycidae).

Deze boktor is overwegend zwart. De spriet en poten zijn bruinrood. De dekschilden vertonen in het midden een typisch geelwitte dwarsband met zwarte stipjes. Elk dekschild draagt in de voorste helft en achteraan nog een vlek van dezelfde kleur. De vlekken achteraan bezitten geen zwarte stippen. Volgens du Chatenet (2000: 299) is deze boktor afkomstig uit Australië waar de larven zich ontwikkelen in eucalyptushout. De kever is tegenwoordig te vinden in het

Middellandse-Zeegebied waar hij zich thuisvoelt in aanplantingen van eucalyptusbossen.

Sama (2010) vermeldt volgende Europese landen: Cyprus, Frankrijk (vasteland en Corsica), Griekenland, Italië (vasteland en Sardinië, Sicilië), Malta, Portugal, Spanje (vasteland, Balearen en Kanarische eilanden). Verder is de soort ook bekend uit Noord-Afrika en het Afrotropische gebied, het Nabije-Oosten, het Nearctische en Neotropische gebied. Enkel in het Oost-Palaearctische en Oriëntaalse gebied blijkt *P. semipunctata* (nog) niet voor te komen (Sama 2010).

Bibliografie

Chapelin-Viscardi, J.-D. 2009. Sur la chorologie, phénologie et écologie d'un Cleridae exotique en France: *Paratillus carus* (Newman, 1840) (Coleoptera Cleridae). — *Bulletin de la Société entomologique de France* **114**(3): 365–372.

Du Chatenet, G. 2000. *Coléoptères phytophages d'Europe*. — N.A.P. Editions, Vitry-sur-Seine.



Fig. 1. *Phoracantha semipunctatus* (Fabricius, 1775), Olhos d'Agua (Portugal), 24.v.2005.

Sama, G. 2010. Fauna Europaea. Coleoptera: Cerambycidae. — In: Audisio, P. (ed.) *Fauna Europaea: Coleoptera*. Version 2.2. — www.faunaeur.org [bezocht op 17.xi.2010].

Troukens, W. 1985. Een verstekeling uit Nieuw-Zeeland: *Diaphonia dorsalis* Donovan (Coleoptera: Scarabaeidae). — *Phegea* **13**(3): 92.